



お薬つるっと飲むゼリー


服用支援
ゼリー

eジュレ

オレンジ
無果汁

離水しにくい!
むせにくい!

薬をしっかり包み込んで、
スムーズに胃までおくれます!



- 薬を飲むのが苦手な方におすすめ。
- 密封されているので衛生的。
- 水なしでも薬が飲める服用支援ゼリー。



離水がないのでスプーンを逆さまにしても落ちません



ゼリーと薬が一塊になりスムーズに飲めます



eジュレオレンジ
(5mL×10包)



1日3回、3日分 お得用1ヶ月分



JAN4571481130648

JAN4571481130624

5mL×10包入

5mL×100包入



オレンジ(無果汁)

1包25回使用可 (1回6mL 使用した場合)



JAN4571481130693

キャップ付

150mL×1包入



オレンジ(無果汁)

1包3回使用可



JAN4571481130686

21mL×10包入

～ゼリーによる服薬は“離水なし”と“食塊”が重要～

離水の多いゼリー



離水が多いと、飲みこみの流動中にゼリーと薬がバラけて気管に流れやすくなり、むせの原因・誤嚥性肺炎の原因となります。


離水の少ないeジュレ



離水が少ないので、飲みこみの流動中でも薬とゼリーがひと塊りとなり、気管に流れることなくスムーズに胃まで流れます。

「嚥下訓練食品0j」の条件の一つ
ゼリーは、適切な食塊、硬さと離水が少ないこと

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 (学会分類 2013 より)



eジュレ使用方法 ※開封前には本体をよく揉んでご使用ください

■容器に出して飲む場合

- ①薬を容器(小皿や湯のみ茶碗等)に入れます。
- ②開封前は、よく揉み、斜め上に切り取り、開封してください。
- ③容器に入った薬の上からゼリーを入れてください。
- ④薬をゼリーで包みこみ、スプーンで混ぜてお飲みください。

■スプーンに出して飲む場合

- ①開封前には、よく揉んでください。
- ②切り口から斜め上に切り取り、開封してください。
- ③スプーンに半量のゼリーを出し、その上に薬をのせて、さらにゼリーを出して重ねます。
- ④ゼリーが薬全体を覆った状態で飲みください。

- 名称:清涼飲料水(ゼリー飲料)
- 原材料名:甘味料(キシリトール、還元麦芽糖水飴、砂糖)、増粘多糖類、酸味料、香料、乳酸カルシウム、保存料(安息香酸ナトリウム、安息香酸)、着色料(食用黄色5号)
- 保存方法:直射日光、高温多湿をさけ、常温で保管してください。

栄養成分表示(5mL当たり)

エネルギー	2.9kcal	ナトリウム	2.9mg
たんぱく質	0.0g	カリウム	0.1mg
脂質	0.0g	カルシウム	2.6mg
炭水化物	0.8g		

使用上の注意

- 開封前には、ゼリーが崩れるまでよく揉んでください。
- 開封後は、冷蔵庫に入れてその日のうちにお召し上がりください。
- ゼリーがまれに離水することがありますが、品質に問題はありません。
- 飲用される方の体質により、おなかゆるくなる場合があります。
- 本製品は服用支援を目的としておりますので必要に応じて水を補ってください。
- 薬剤の種類によっては、苦味が増す場合があります。
- 容器にゼリーの漏れ等がある場合には使用しないでください。
- 容器のフチで手や口を切らないようにご注意ください。



株式会社モリモト医薬

お客様相談室
フリーダイヤル

☎0120-600-937 (平日のみ 9:00~17:00)

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 5-8-28 Tel.06-6476-5473 Fax.06-6476-5573

http://www.morimoto-iyaku.jp E-mail customer@m-ph.co.jp

